

信息说明书



使用莫努匹韦治疗2019冠状病毒病

如果您有英语语言方面的困难，请让员工预约口译员。
您也可以在家拨打 9605 3056 联系电话口译服务。
服务为免费提供。请询问员工本信息是否有中文版本。

本信息面向哪些人？

本信息说明书内含对于可能使用名为 **Lagevrio**（又名莫努匹韦，molnupiravir）的药物治疗 2019 冠状病毒病（COVID-19）的（18 岁以上）成人患者的重要信息。

莫努匹韦是什么药？

莫努匹韦是为治疗 2019 冠状病毒病而开发的。它属于抗病毒类药物，通过阻止病毒在人体内繁殖来产生疗效。

用莫努匹韦治疗 2019 冠状病毒病有哪些潜在好处？

如果在感染 2019 冠状病毒病后最初 5 天内使用，莫努匹韦可能将因为感染 2019 冠状病毒病而住院或死亡的几率降低多达 30%。

患者在接受莫努匹韦治疗之前必须给予同意（批准）。在此过程中，医生会告知潜在的好处以及任何风险。如果患者对于接受莫努匹韦治疗改变想法，可以随时撤销同意。

如何使用莫努匹韦？

莫努匹韦采用药片形式给药。确切地说，莫努匹韦的用药剂量为每次四片，每天两次，服用五天（一个疗程共 40 粒药片）。为降低 2019 冠状病毒未来对莫努匹韦产生抗药性的几率，患者应该服完整个疗程的药，这很重要。

莫努匹韦有哪些副作用？

大多数使用莫努匹韦的患者没有出现副作用。以下是使用莫努匹韦治疗 2019 冠状病毒病期间可能出现的一些副作用。使用莫努匹韦的 2019 冠状病毒病患者还可能出现其它未知副作用。

可能的副作用包括：

- 腹泻（不常见）
- 呕吐（不常见）
- 头晕（不常见）

莫努匹韦治疗是否需要特殊防范措施？

- 妊娠：对于妊娠期内的患者，目前建议不要使用莫努匹韦。
- 避孕：
 - 建议有可能怀孕的女性在治疗期间以及服用最后一剂莫努匹韦后 4 天内采取有效的避孕措施。
 - 有性生活的男性如果有可能怀孕的伴侣，建议在接受莫努匹韦治疗期间以及治疗后 3 个月内采取充分的避孕措施。
- 母乳喂养：由于莫努匹韦可能对婴儿造成不良反应，建议在治疗期间以及服用最后一剂莫努匹韦后 4 天内不要进行母乳喂养。

我现在需要做什么？

如果您已被告知您可能符合接受莫努匹韦治疗的条件，而且您针对 2019 冠状病毒病的快速抗原检测（RAT）或聚合酶链式反应（PCR）检测结果为阳性，请尽快通知您的全科医生（GP）或专科治疗小组，以便获得持续的病情管理。

保护您的隐私

Eastern Health 致力于保护您的隐私。我们将安全保存您的个人信息，而且只有在法律要求或允许时才会披露您的信息。我们遵守相关隐私法规。如需更多信息，请咨询员工或访问我们的网站 www.easternhealth.org.au。

Eastern Health 已通过澳大利亚医疗服务标准委员会（Australian Council on Healthcare Standards）认证。

5 Arnold Street, Box Hill, Victoria 3128
1300 342 255

© Eastern Health 2018
2022 年 3 月 1 日

如果您有任何改进本信息说明书的反馈或建议，请联系患者体验中心，
电子邮件：feedback@easternhealth.org.au，电话：1800 327 837。