

阿咖片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

严禁用于食品和饲料加工

[药品名称]

通用名称：阿咖片

英文名称：Aspirin and Caffeine Tablets

汉语拼音：Aka Pian

[成份] 本品为复方制剂，每片含阿司匹林 300 毫克，咖啡因 35 毫克。辅料为：淀粉、枸橼酸、预胶化淀粉、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸。

[性状] 本品为薄膜衣片；除去包衣后显白色；味微酸，遇湿易变质。

[作用类别] 本品为解热镇痛类非处方药药品。

[适应症] 用于缓解普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

[规格] 阿司匹林 0.3g，咖啡因 35mg，枸橼酸 3mg

[用法用量] 口服。成人一次 2 片，一日 3 次。

[不良反应]

1. 较常见的有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等胃肠道反应。
2. 较少见或罕见的有（1）胃肠道出血或溃疡，表现为血性或柏油样便，胃部剧痛或呕吐血性或咖啡样物，多见于大剂量服药患者。（2）支气管痉挛性过敏反应，表现为呼吸困难或哮喘。（3）皮肤过敏反应，表现为皮疹、荨麻疹、皮肤瘙痒等。（4）血尿、眩晕和肝脏损害。

[禁忌]

1. 孕妇、哺乳期妇女禁用。
2. 哮喘、鼻息肉综合征、对阿司匹林和其他解热镇痛药过敏者禁用。
3. 血友病或血小板减少症、溃疡病活动期患者禁用。

[注意事项]

1. 本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过 3 天，用于止痛不超过 5 天，症状未缓解请咨询医师或药师。
2. 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
3. 年老体弱患者应在医师指导下使用。
4. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
5. 痛风、肝肾功能减退、心功能不全、鼻出血、月经过多以及有溶血性贫血史的患者慎用。
6. 儿童用量请咨询医师或药师。
7. 如服用过量，或有严重不良反应者请立即就医。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 本品不宜与抗凝血药（如双香豆素、肝素）及溶栓药（链激酶）同用。
2. 抗酸药如碳酸氢钠等可增加本品自尿中的排泄，使血药浓度下降，不宜同用。
3. 本品与糖皮质激素（如地塞米松等）同用，可增加胃肠道不良反应。

4. 本品可加强口服降糖药及甲氨蝶呤的作用，不应同用。

5. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 阿司匹林能抑制前列腺素合成，具有解热镇痛作用；咖啡因为中枢兴奋药，能增强阿司匹林的解热镇痛作用。

[贮藏]密封，在干燥处保存。

[包装]铝塑包装：塑料瓶包装：30片/瓶，50片/瓶；铝塑包装：2x6片/板/盒，2x12片/板/盒。

[有效期]24个月

[执行标准] 国家药品标准 WS-10001-(HD-0235)-2002

[批准文号]国药准字 H37023204

[说明书修订日期]核准日期：2007.04.06； 修改日期：2011.05.31

[生产企业]

企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市张店区东一路14号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2184991

网址：www.xhzy.com

如有问题可与生产企业联系

阿咖片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

严禁用于食品和饲料加工



[药品名称]

通用名称：阿咖片

商品名称：利腾—去掉为商标名

英文名称：Aspirin and Caffeine Tablets

汉语拼音：Aka Pian

[成份] 本品为复方制剂，每片含阿司匹林 300 毫克，咖啡因 35 毫克。辅料为：淀粉、枸橼酸、预胶化淀粉、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸。

[性状] 本品为薄膜衣片；除去包衣后显白色；味微酸，遇湿易变质。

[作用类别] 本品为解热镇痛类非处方药药品。

[适应症] 用于缓解普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

[规格] 阿司匹林 0.3g，咖啡因 35mg，枸橼酸 3mg

[用法用量] 口服。成人一次 2 片，一日 3 次。

[不良反应]

1. 较常见的有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等胃肠道反应。
2. 较少见或罕见的有（1）胃肠道出血或溃疡，表现为血性或柏油样便，胃部剧痛或呕吐血性或咖啡样物，多见于大剂量服药患者。（2）支气管痉挛性过敏反应，表现为呼吸困难或哮喘。（3）皮肤过敏反应，表现为皮疹、荨麻疹、皮肤瘙痒等。（4）血尿、眩晕和肝脏损害。

[禁忌]

1. 孕妇、哺乳期妇女禁用。
2. 哮喘、鼻息肉综合征、对阿司匹林和其他解热镇痛药过敏者禁用。
3. 血友病或血小板减少症、溃疡病活动期患者禁用。

[注意事项]

1. 本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过 3 天，用于止痛不超过 5 天，症状未缓解请咨询医师或药师。
2. 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
3. 年老体弱患者应在医师指导下使用。
4. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
5. 痛风、肝肾功能减退、心功能不全、鼻出血、月经过多以及有溶血性贫血史的患者慎用。
6. 儿童用量请咨询医师或药师。
7. 如服用过量，或有严重不良反应者请立即就医。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 本品不宜与抗凝血药（如双香豆素、肝素）及溶栓药（链激酶）同用。
2. 抗酸药如碳酸氢钠等可增加本品自尿中的排泄，使血药浓度下降，不宜同用。
3. 本品与糖皮质激素（如地塞米松等）同用，可增加胃肠道不良反应。
4. 本品可加强口服降糖药及甲氨蝶呤的作用，不应同用。
5. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 阿司匹林能抑制前列腺素合成，具有解热镇痛作用；咖啡因为中枢兴奋药，能增强阿司匹林的解热镇痛作用。

[贮藏] 密闭，在干燥处保存。

[包装] 铝塑包装：塑料瓶包装：30片/瓶，50片/瓶；2x6片/板/盒，2x12片/板/盒。

[有效期] 24个月

[执行标准] WS-10001-(HD-0235)-2002

[批准文号] 国药准字 H37023204

[说明书修订日期] 核准日期：2007.04.06； 修改日期：2011.05.31

[生产企业]

企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市张店区东一路14号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2184991

网址：www.xhzy.com

如有问题可与生产企业联系

A

